

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2018年4月
帝國製薬株式会社

経皮鎮痛消炎剤

ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」

(一般名：ケトプロフェン)

このたび、弊社製品のケトプロフェンテープ20mg「テイコク」およびケトプロフェンテープ40mg「テイコク」の使用上の注意を下記のとおり改訂いたしましたのでお知らせいたします。今後のご使用に際しては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容 (____ : 自主改訂)

改訂後	現行														
<p>4.副作用 (現行どおり)</p> <p>(2)その他の副作用</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td>皮膚^{注)}</td><td>皮膚剥脱、局所の発疹、発赤、腫脹、 掻痒感、刺激感、水疱・びらん、色素 沈着、皮下出血等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫</td></tr><tr><td>消化器</td><td>消化性潰瘍</td></tr></table> <p>注) このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。</p>		頻度不明	皮膚 ^{注)}	皮膚剥脱、局所の発疹、発赤、腫脹、 掻痒感、刺激感、水疱・びらん、色素 沈着、皮下出血等	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫	消化器	消化性潰瘍	<p>4.副作用 (省略)</p> <p>(2)その他の副作用</p> <table border="1"><tr><td></td><td>頻度不明</td></tr><tr><td>皮膚^{注)}</td><td>皮膚剥脱、局所の発疹、発赤、腫脹、 掻痒感、刺激感、水疱・びらん、色素 沈着、皮下出血等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫</td></tr></table> <p>注) このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。</p>		頻度不明	皮膚 ^{注)}	皮膚剥脱、局所の発疹、発赤、腫脹、 掻痒感、刺激感、水疱・びらん、色素 沈着、皮下出血等	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫
	頻度不明														
皮膚 ^{注)}	皮膚剥脱、局所の発疹、発赤、腫脹、 掻痒感、刺激感、水疱・びらん、色素 沈着、皮下出血等														
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫														
消化器	消化性潰瘍														
	頻度不明														
皮膚 ^{注)}	皮膚剥脱、局所の発疹、発赤、腫脹、 掻痒感、刺激感、水疱・びらん、色素 沈着、皮下出血等														
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫														

■改訂理由

同一成分薬の使用上の注意改訂情報に基づき、本製品の使用上の注意を改訂し、「その他の副作用」の項に「消化性潰瘍」を追記いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報（DSU）No.269」（2018年5月）に掲載されます。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）、または弊社ホームページ（http://www.teikoku.co.jp/japanese/contents/medical/medical_01.html）でご確認ください。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、すでにお手元にある製品のご使用に際しては、ここにご案内申し上げます改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

《製造販売元》

帝國製薬株式会社

《製品に関するお問い合わせ先》 帝國製薬株式会社 医薬営業部 製品情報室

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号

TEL : 0120-189-567

受付時間 月～金 9:00～17:30（祝祭日および当社休日を除く）